

核准日期：2018年09月04日

修订日期：2019年02月11日，2020年06月01日，2023年05月25日，2024年12月25日

BIOHUI[®]
博晖生物



3. 开瓶后，能应一次注射完毕，不得分次使用。

【药理毒理】

【药物名称】

1. 本品可能引起过敏反应，严重者可发生过敏性休克。甲肝

疫苗使用，本品含蔗糖成分时作易过敏，禁食

前应先详细询问患者用药史和过敏史。用药过程中应密切观

察，从预防和治疗破伤风及细菌感染的作用。

毒理研究：尚不明确。

【用法

【替代动力等】

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。

【用法用量】本品为肌肉注射，成人每次注射0.5ml，儿童每次注射0.25ml，每日一次，连用3天。