

核准日期：2018年05月09日

修订日期：2019年01月03日、2020年06月01日、2022年13月25日、2023年01月2日

BIKHUI®
博晖生物

犬狂犬病免疫球蛋白

请仔细阅读说明，请严格按照说明书使用

语：本品因原料来自人血，虽然对原料血浆进行了相关病原体的筛查，并在生产工艺中加入了去除和灭活病毒的措
理论上仍存在传播某些已知和未知病原体的潜在风险，临床使用时应权衡利弊。

警示

施

品名称

用量：注射剂量按20IU/kg体重计算（或遵医嘱）

125

通用名：狂犬病人免疫球蛋白

次注射：如所需总剂量大于10ml，可在1-2日内分次

英文名：Rabies Immune Globulin

注射，随后即可进行狂犬疫苗接种。本品和疫苗应分

汉语拼音：Kuanggan Jiansheng Res. Minzhuqizhenhu

射部位和器具要严格分开。

【成份】

【不良反应】

主要成份：狂犬病人免疫球蛋白

本品可能引起以下不良反应/事件：

辅料：苯基醇、甘氨酸

由于这些不良反应/事件是在无法确定人数的人群

【性状】

直接观察的，因此不能准确估计其发生率，可能出

本品为无色或淡黄色澄明液体，可带乳光，不应出现

时使用多种药物，无法准确判断相关性。

浑浊。

全身性反应：发热、胸部不适、乏力、畏寒、寒战

【适应症】

局部反应：皮疹、红斑、肿胀/红晕、硬结等

主要用于被狂犬或其他种狂犬咬伤或抓伤、舔伤、

皮肤及皮下组织、荨麻疹、红疹、荨麻疹、红斑性

由该抗体引起者。

已证实本品可引起以下不良反应/事件：

感觉异常、意识障碍等。

【规格】

神经系统：头痛、头晕、晕厥、

过敏反应

每瓶含狂犬病免疫球蛋白200IU（125ml）

呼吸系统：咳嗽、气促、喉痛、

反应、过敏性休克等。

【用法用量】

免疫系统：过敏反应、类过敏

脉搏异常、心悸、血压降

用法：及时彻底清创后，于受伤部位用本品总剂量的

心血管系统：面色苍白/潮红、

1/2作皮下浸润注射，余下1/2进行肌肉注射（头部咬

低、四肢发冷等。

「食物想玩箱里」

2. 有抗IgA抗体的选择性IgA缺乏者禁用。

【注意事项】

1. 本品不得用作静脉注射。
2. 本品肌肉注射不需做过敏试验。

2. 使用本品后，三个月内不得接种麻疹疫苗，因为抗体干扰疫苗免疫应答。

【药物过量】

中国广告学发展史论纲

【法律專理】

[illegible]

本品可致严重过敏反应（包括过敏性休克），因此，
本品不适用于已知对青霉素类过敏患者和青霉素过敏者。
本品可能引起其他过敏反应，如皮疹、荨麻疹、哮喘、
喉头水肿、低血压、休克等。

注射液用氯化丁基橡胶塞	治疗 6. 有血栓栓塞危险因素的患者应注意监测血栓事件	【包装】 由硼硅玻璃管制注射液
-------------	--------------------------------	--------------------

[illegible]

7. 运输及贮藏过程中严禁冻结。	36个月。
【孕妇及哺乳期妇女用药】	【执行标准】

未专门进行该项针对性试验研究，且无系统可靠的参考文献。尚不清楚使用本品是否会影响生殖能力以及妊娠结局。使用本品是否对胎儿造成损害，妊娠妇女只有在必须使用时且经医师充分权衡利弊后慎用。

直昇机公司
 主主门进行这项针对试验研究 已于系统可靠的多
 【生产企业】

石家庄生物制药厂 石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号 050200 0311-83935518	【老年用药】 未专门进行该项针对性试验研究，但无系统可靠的参 考文献	合盛生物 生产地址 邮政编码 电话
--	--	---